

## ПАМЯТКА

### **Возможность привиться от COVID-19 назальным способом.**

Вакцицирование проводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели, то есть - в режиме "прайм-буст".

### **Способ применения и дозы**

Перед назальным вакцинированием исключить введение в носовые ходы любые назальные препараты.

Вакцина предназначена для внутримышечного введения. Допускается интраназальное введение вакцины при помощи дозирующего устройства (насадка-распылитель на шприц вертикального типа для назального применения лекарственных средств), в один носовой ход на вдохе. Вакцинацию проводят в два этапа: компонентом I в дозе 0,5 мл, затем, через 3 недели - компонентом II в дозе 0,5 мл. Допускается отдельное введение компонентов. Клинические исследования назального применения идентичной вакцины показали благоприятный профиль безопасности и иммуногенности.

За сутки до введения вакцины и в течение недели после воздержаться от интенсивных занятий физкультурой и контактных видов спорта, не курить за час до и час после вакцинации.

Перед введением препарата рекомендуется высморкаться, проверить проходимость носовых ходов поочередно закрывая один носовой ход и делая несколько вдохов.

После интраназального введения вакцины в течение 2-х часов следует воздерживаться от чихания и высмаркивания, также необходимо исключить курение, прием пищи и жидкости.

Назальное вакцинирование рекомендуется для ревакцинации от COVID-19, поскольку оно выступает "бустером" для уже имеющегося иммунитета - создает "местный" иммунитет.